



## ハスモンヨトウ注意報発令



岐阜県病害虫防除所より令和8年7月29日付で  
ハスモンヨトウ注意報〈大豆・野菜・果樹・花卉〉が発令されました。  
害虫防除を徹底し、被害防止、品質・収量の向上を目指しましょう！

### 大豆におけるハスモンヨトウ対策

本年はハスモンヨトウの発生が例年より早く、一部のほ場ですでに食害が確認されています。今後の発生拡大が懸念されるため、ほ場をよく観察し、発生状況に応じて防除を実施しましょう。

ハスモンヨトウは、幼虫の齢期が進むと薬剤の効果が低下するため、発生を確認したら直ちに防除を実施しましょう！



網目状に食害された大豆の葉(白変葉)

#### 【大豆ハスモンヨトウ対策推奨薬剤】

| 農薬名      | 対象病害虫   | 希釈倍率・使用量<br>(10aあたり)         | 使用時期    | 使用回数 | 使用方法 |
|----------|---------|------------------------------|---------|------|------|
| プレオフロアブル | ハスモンヨトウ | 1,000～2,000倍<br>100～300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布   |
| プロフレアSC  | ハスモンヨトウ | 2,000～4,000倍<br>100～300L/10a | 収穫前日まで  | 3回以内 | 散布   |

### 野菜類におけるハスモンヨトウ対策

ハスモンヨトウの幼虫は、キャベツやブロッコリーなどの野菜を好んで食害します。特に、生育初期段階や、作物の生長点付近に ハスモンヨトウの食害を受けると、大幅な収量の減少、品質の低下に繋がってしまいます。

ハスモンヨトウは、若齢幼虫の防除が非常に重要になります。圃場をよく観察し、早期の防除を徹底しましょう。



葉裏に卵を産み付ける為  
葉裏までチェック  
しましょう

#### 【野菜・果樹・花き類 ハスモンヨトウ対策 推奨薬剤】

| 薬剤名         | 薬剤の特徴                                 | キャベツ | ブロッコリー | カリフラワー | はくさい | ばれいしょ | こまつな | ほうれんそう | みかん | かき | 花き類 |
|-------------|---------------------------------------|------|--------|--------|------|-------|------|--------|-----|----|-----|
| プレオフロアブル    | ・チョウ目害虫やアザミウマ類への効果が高い。<br>・適用作物の幅が広い。 | ○    | ○      | ○      |      | ○     | ○    | ○      |     |    | ○   |
| プロフレアSC     | ・チョウ目・ハムシ類への効果が高い。<br>・速攻性、残効性ともに優れる。 | ○    | ○      | ○      | ○    |       |      | ○      |     |    |     |
| アフーム乳剤      | ・チョウ目害虫への効果が高い。<br>・効果の発現が速い。         | ○    | ○      |        |      |       |      | ○      |     |    |     |
| フェニックスフロアブル | ・チョウ目害への効果が高い。<br>・残効性に優れる。           |      |        |        |      |       |      |        | ○   | ○  |     |

農薬を使用する際は、ラベル等の表示をよく確認し、使用回数・使用方法等に十分注意しましょう！